

Séquence 15 : Arithmétique

📎📎📎 OBJECTIFS : 📎📎📎

À la fin de cette Séquence 15, je dois connaître ...	Pour m'entraîner :
Le vocabulaire et les critères de divisibilité.	Cours partie A
La définition d'un nombre premier et tous les nombres premiers inférieurs à 30.	Cours partie B
La définition d'une fraction irréductible.	Cours partie C

Je dois savoir faire ...	Pour m'entraîner :		
	★	★★	★★★
Effectuer une division euclidienne.	n°1, 2, 3	n°4, 5	
Reconnaître les multiples et les diviseurs d'un nombre.	n°6, 7	n°8, 9	n°10
Reconnaître un nombre premier.	n°11	n°12	n°13
Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.	n°14, 15		n°16
Simplifier une fraction pour la rendre irréductible.	n°17, 18	n°19	
Résoudre des problèmes relevant de l'arithmétique (dont type Brevet).		n°20	n°21, 22

L'**arithmétique** est le domaine des mathématiques qui étudie les **nombre entiers**, c'est-à-dire ceux « sans virgule ». C'est un domaine des mathématiques qui a notamment de nombreuses applications en cryptographie, en particulier grâce à l'étude de certains nombres particuliers appelés « nombres premiers ».

Remarque importante : Dans tout ce cours, a et b seront des nombres entiers positifs, avec $b \neq 0$.

A) Divisibilité

1. Division euclidienne

🔗 Définition 1 : Division euclidienne

Effectuer la **division euclidienne** de a par b , c'est trouver deux autres nombres **entiers positifs** q et r tels que :

$$a = bq + r \quad \text{avec } 0 \leq r < b$$

🔗 Exemple(s) :

Pose et effectue les divisions euclidiennes suivantes :

$$361 \div 7 :$$

.....

 🗣️ dividende :
 🗣️ diviseur :
 🗣️ quotient :
 🗣️ reste :

$$35 \div 5 :$$

.....

 🗣️ dividende :
 🗣️ diviseur :
 🗣️ quotient :
 🗣️ reste :
 On dit que 35 est **divisible par 5**.

$$9 \div 15 :$$

.....

 🗣️ dividende :
 🗣️ diviseur :
 🗣️ quotient :
 🗣️ reste :

2. Critères de divisibilité

Définition 2 : Divisibilité

Si le **reste** de la division euclidienne de a par b est nul ($= 0$), on dit au choix que :

 b est a

 a est b

 a est b

Cela revient à dire que b est « dans la table de » a .







Exemple(s) :

$5 \times 3 = 15$ donc on peut dire :


- 
- 
- 
- 
- 
- 

 On ne peut PAS dire « 5 est divisible par 15 », ou « 15 est un diviseur de 3 », ou encore « 5 est un multiple de 15 ». 

Propriété 1 : Critères de divisibilité

-  Si un entier est **pair** (se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8), alors il est **divisible par 2** ;
-  Si la **somme des chiffres** d'un nombre est divisible par 3, alors ce nombre est **divisible par 3** ;
-  Si le **nombre formé par les deux derniers chiffres** d'un nombre est divisible par 4, alors il est **divisible par 4** ;
-  Si un nombre **se termine par 0 ou 5**, alors il est **divisible par 5** ;
-  Si la **somme des chiffres** d'un nombre est divisible par 9, alors ce nombre est **divisible par 9** ;
-  Si un nombre **se termine par 0**, alors il est **divisible par 10** ;

Exemple(s) :

-  Nombres divisibles par 2 :
-  Nombres divisibles par 3 :
-  Nombres divisibles par 4 :
-  Nombres divisibles par 5 :
-  Nombres divisibles par 9 :
-  Nombres divisibles par 10 :

B) Nombres premiers

1. Introduction : le crible d'Ératosthène

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Dans la grille ci-contre :

1. Commence par barrer le 1
2. Entoure 2 puis barre **tous les multiples** de 2
3. Entoure le plus petit nombre non barré (c'est-à-dire 3) puis barre tous ses multiples
4. Répète l'étape 3 jusqu'à ce que tous les nombres de la grille soient barrés ou entourés.

Que peut-on dire des nombres entourés ?

2. Définition et exemples à connaître

🔗 Définition 3 : Nombre premier

🔗 Exemple(s) :

🔗 4 n'est pas premier :

🔗 \triangle 1 n'est pas un nombre premier ! Il n'a en effet qu'un seul diviseur : lui-même \triangle

🔗 Les 15 nombres premiers inférieurs à 50 sont à connaître **PAR CŒUR** :

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 43 ; 47

3. Décomposition en facteurs premiers

🔗 Propriété 2 : Décomposition en facteurs premiers

🔗 Méthode 1 : Décomposition en facteurs premiers

Pour décomposer un nombre N en produit de facteurs premiers, on commence par chercher le plus petit nombre premier qui divise N , et on effectue cette division autant de fois que c'est possible. Puis on recommence avec le nombre premier suivant, et ainsi de suite jusqu'à obtenir 1.

🔗 Exemple(s) :

$\begin{array}{r l} 126 & 2 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$ $126 = 2 \times 3^2 \times 7$	$\begin{array}{r l} 504 & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \end{array}$ $504 = \dots\dots\dots$	$\begin{array}{r l} 2\ 530 & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \end{array}$ $2\ 530 = \dots\dots\dots$	$\begin{array}{r l} 728 & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots \end{array}$ $728 = \dots\dots\dots$
--	---	---	---

C) Simplification de fractions

🔗 Définition 4 : Fraction irréductible

Remarque : On dit que a et b sont « premiers entre eux » (voir exercice n°13 du livret).

🔗 Exemple(s) :

Les fractions suivantes sont irréductibles :

☞ $\frac{3}{7}$ car : diviseurs de 3 : { } et diviseurs de 7 : { }

☞ $\frac{15}{4}$ car : diviseurs de 15 : { } et diviseurs de 4 : { }

☞ $\frac{22}{9}$ car : diviseurs de 22 : { } et diviseurs de 9 : { }

Les fractions suivantes ne sont pas irréductibles :

☞ $\frac{6}{9}$ car 6 et 9 ont comme diviseur commun autre que 1.

☞ $\frac{13}{26}$ car 13 et 26 ont comme diviseur commun autre que 1.

☞ $\frac{63}{21}$ car 63 et 21 ont comme diviseurs communs autres que 1.

🔗 Propriété 3 : Rappel sur les fractions

On ne change pas une fraction en multipliant ou en divisant son numérateur par un même nombre (non nul) !

🔗 Méthode 2 : Simplifier une fraction

Pour simplifier une fraction, la méthode la plus simple est de décomposer son numérateur ET son dénominateur en facteurs premiers, puis de simplifier les facteurs identiques :

🔗 Exemple(s) :

Simplifions la fraction $\frac{204}{72}$. Pour cela on commence par décomposer 204 et 72 en facteurs premiers :

--	--

On peut ensuite simplifier la fraction :

$$\frac{204}{72} = \dots\dots\dots$$